

# Inhaltsverzeichnis

Tabellenverzeichnis .....	7
Abbildungsverzeichnis .....	8
Kurzfassung .....	9
Short Report .....	16
1 Einleitung und Fragestellungen .....	23
1.1 Ausgangslage .....	23
1.2 Kurzbeschreibung der Narkose-Entzugsbehandlung .....	23
1.3 Fragestellungen .....	24
2 Methodik .....	25
2.1 Untersuchungsansatz .....	25
2.2 Daten und Erhebungsinstrumente .....	25
2.3 Patienten .....	26
2.4 Durchführung .....	26
2.5 Datenanalyse .....	27
3 Klientenstatistik .....	28
4 Aufnahme .....	30
4.1 Basisdaten .....	30
4.2 Suchtmittelkonsum und soziale Folgen der Sucht .....	32
4.3 Vorbehandlungen .....	37
4.4 Psychischer Status .....	38
4.5 Körperlicher Status .....	38
4.6 Medikation .....	41
4.7 Entzugssymptome vor dem Narkose-Entzug .....	41
4.8 Beschwerden, Symptome (Selbstbeobachtung) .....	41
5 Verlauf .....	43
5.1 Intensivstation .....	43
5.1.1 Vorbemerkung .....	43
5.1.2 Dauer der Narkose und Vitalwerte .....	43
5.1.3 Medikationen .....	43
5.1.4 Entzugssymptome auf der Intensivstation .....	45
5.2 Suchtstation .....	45
5.2.1 Entzugssymptome auf der Suchtstation (nach der Narkose) .....	45
5.2.2 Selbstbeobachtung der Beschwerden nach der Narkose .....	48
5.2.3 Vitalwerte .....	48
5.2.4 Bedarfsmedikationen .....	49
5.2.5 Laborwerte .....	50
6 Entlassung .....	51
7 Katamnesen .....	52
7.1 Katamnesenstatistik und Vorgehen .....	52
7.2 Konsum psychotroper Substanzen .....	53
7.2.1 Substitutionsbehandlungen im Katamnesezeitraum .....	53
7.2.2 Abstinenz im Katamnesezeitraum .....	54
7.2.3 Verlauf des Drogenkonsums in den ersten 12 Monaten der Katamnese .....	56

7.2.4	Gründe und soziale Folgen des Suchtmittelkonsums.....	60
7.2.5	Belastung durch Drogenkonsum .....	62
7.3	Gesundheitliche Situation .....	63
7.4	Naltrexoneinnahme .....	67
7.4.1	Einnahmeverhalten.....	67
7.4.2	Patientengruppen mit unterschiedlicher Naltrexon-Einnahme.....	68
7.5	Weitere Behandlungen .....	71
7.6	Arbeits- und Unterhaltssituation.....	72
7.7	Soziale Beziehungen.....	73
7.8	Wohn- und Freizeitsituation .....	74
7.9	Justitielle Situation.....	74
7.10	Beurteilung des Narkose-Entzugs durch Patienten .....	75
8	Vergleiche zwischen Teilgruppen von Patienten.....	82
8.1	Vorzeitige und reguläre Beender .....	82
8.1.1	Aufnahme .....	82
8.1.2	Intensivstation.....	83
8.1.3	Suchtstation.....	84
8.1.4	Katamnesezeitraum.....	85
8.2	Vergleich zwischen Patienten mit schwerer und leichter Entzugssymptomatik .....	87
8.2.1	Vorgehen.....	87
8.2.2	Unterschiede bei der Aufnahme .....	89
8.2.3	Intensivstation.....	91
8.2.4	Suchtstation.....	91
8.2.5	Unterschiede im Katamnesezeitraum .....	91
9	Diskussion und Schlußfolgerungen.....	94
9.1	Untersuchungsansatz.....	94
9.2	Datenerhebung.....	94
9.3	Status bei Aufnahme .....	95
9.4	Entlassung.....	96
9.5	Katamnese .....	96
9.6	Schlußfolgerungen .....	99
10	Literaturverzeichnis .....	102
11	Tabellenanhang .....	104

## Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Geschlecht und Alter.....	30
Tabelle 2: Substanzinduzierte Störungen bei Aufnahme.....	32
Tabelle 3: Ärztlich verschriebene Substitutionsbehandlungen.....	33
Tabelle 4: Drogenscreening bei Aufnahme.....	34
Tabelle 5: Einstiegsalter für verschiedene Substanzgruppen.....	35
Tabelle 6: Dauer des Konsums.....	36
Tabelle 7: Vitalwerte vor dem Narkose-Entzug.....	39
Tabelle 8: Laborwerte zum Aufnahmezeitpunkt.....	40
Tabelle 9: Medikation auf der Intensivstation.....	44
Tabelle 10: Dosierung von Naltrexon.....	44
Tabelle 11: Verlauf der aufgetretenen Entzugssymptome.....	46
Tabelle 12: Verlauf der aufgetretenen Entzugssymptome: Anteil der Männer bzw. Frauen, bei denen das jeweilige Entzugssymptom auftrat, unabhängig vom Schweregrad.....	54
Tabelle 13: Abstinenz im Katamnesezeitraum.....	55
Tabelle 14: Beginn des Suchtmittelkonsums im Katamnesezeitraum.....	57
Tabelle 15: Konsum zur Zeit des stärksten Gebrauchs.....	60
Tabelle 16: Gründe für Suchtmittelkonsum (n=34).....	61
Tabelle 17: Abstinenz im Vergleich von Patienten mit und ohne Naltrexon-Einnahme im Katamnesezeitraum.....	70
Tabelle 18: Bedingungen, unter denen Patienten eine Empfehlung für den Narkose-Entzug aussprechen würden (Mehrfachantworten).....	76
Tabelle 19: Vergleich des Narkose-Entzugs zu einem "normalen" methadongestützten Entzug.....	78
Tabelle 20: Vergleich des Narkose-Entzugs mit einem normalen, kalten Entzug.....	79
Tabelle 21: Häufigkeiten eines starken Entzugssymptoms.....	89

## **Abbildungsverzeichnis**

Abbildung 1: Klientenstatistik .....	28
Abbildung 2: Anzahl der Entzugssymptome im Verlauf (Beurteilung durch Ärzte/Pflegepersonal).....	47
Abbildung 3: Herzfrequenz und Blutdruck im Verlauf.....	49
Abbildung 4: Zeitpunkte des erneuten Drogenkonsums.....	58
Abbildung 5: Längste Abstinenzzeiten einzelner Patienten.....	59
Abbildung 6: Belastung durch Drogenkonsum .....	62
Abbildung 7: Allgemeinbefinden.....	64
Abbildung 8: Beeinträchtigung durch gesundheitliche Probleme .....	65
Abbildung 9: Belastung durch psychische Probleme .....	67
Abbildung 10: Einnahmedauer von Naltrexon in Wochen .....	68
Abbildung 11: Häufigkeit von Behandlungen in den ersten 12 Monaten.....	72